

Head trauma

Indications of urgent Brain CT

حالات الإصابة في الرأس غالباً بتعدي بدون مشاكل أو مضاعفات
لكن لازم : تسأل ٣ أسئلة + تفحص حاجتين

1. Disturbed consciousness اغمى عليه أو فقد الوعي ؟
2. Convulsions حصله تشنجات ؟
3. Vomiting > 3 times رجع أكثر من ٣ مرات ؟
4. Depressed or open skull fracture
إفحص الحممة لاستبعاد وجود كسور ظاهرة

5. Signs of basal skull fracture

- Battle's sign → retro-auricular ecchymosis
- Raccoon eye → peri-orbital ecchymosis
- Hemotympanum
- CSF rhinorrhea, otorrhea

❖ لو في أي حاجة من اللي فاتت موجودة

هتعمل عرض على نائب جراحة المخ و الأعصاب لعمل أشعة مقطعية على المخ

❖ لو المريض حالته كويسة

هتشوف عنده أي حاجة تانية و تعملها (زي جرح مثلاً محتاج خياطة) ثم تمشييه
و تعرف أهله ان لو حصل تشنجات أو اغماء أو ترجيع أكثر من ٣ مرات يجيبوه ثاني

بعض الآراء بتقول (الأطفال أقل من سنة - الكبار أكثر من ٥٠ سنة)
يتم عمل أشعة مقطعية في كل الأحوال

Skull X-Ray

في حالة الرغبة في استبعاد وجود كسر الأنف مثلاً أو كسر غير واضح من الخارج بالجمجمة

Skull X-ray (Antero-Posterior & Lateral view)

أشعة عادية على الرأس (أمامي خلفي - جانبي)